Ames Group

Genetica medica
Anatomia patologica
Microbiologia
Patologia clinica

SEDE LEGALE E OPERATIVA **MILANO**
Via Mazzini n° 3/A Cernusco sul Naviglio,
20063 **Milano (MI)**

**Orari:**
*Lunedì - Venerdì: 08:00 - 18:00*
*Sabato: 08:30 - 13:30*

SEDE OPERATIVA **CASALNUOVO**
Via Padre Carmine Fico, n° 24,
80013 **Casalnuovo di Napoli (NA)**

**Orari:**
*Lunedì - Venerdì: 07:00 - 19:00*
*Sabato: 07:00 - 18:00*
*Domenica: 08:00 - 12:00*

SEDE OPERATIVA **AVELLINO**
Via Brigata n° 30,
83100 **Avellino (AV)**

**Orari prelievi:**
*Lunedì - Venerdì: 07:30 - 11:30*
*Sabato: 07:30 - 11:00*

**Orari segreteria:**
*Lunedì - Venerdì: 07:30 - 12:30 / 16:00 - 18:30*
*Sabato: 07:30 - 11:00*

SEDE OPERATIVA **FIRENZE**
Via Luca Landucci n° 1 Rosso, 50100 **Firenze (FI)**

**Orari:**
*Lunedì - Venerdì: 07:00 - 18:00*
*Sabato: 07:00 - 12:00*

SEDE LOGISTICA **TORINO**
Via Torino n° 57 Settimo Torinese,
10036 **Torino (TO)**

**www.centroames.it**

**informazioni@centroames.it**

AB 13C-LATTOSIO
&
BREATHQUALITY-UBT
13C-UREA

# BREATH TEST

## Test del Respiro

**Breath Test al Carbonio 13 (isotopo stabile):**

Si misura l'anidride carbonica marcata nell'aria espirata dopo l'assunzione di un pasto (solido o liquido) contenente il carbonio 13.

## Cosa si valuta con i Breath Test

- Diagnosticare l'infezione da ***Helicobacter pylori***, causa di dispepsia, ulcera duodenale, reflusso gastroesofageo e tumori dello stomaco.
- Determinare **l'intolleranza al lattosio**, una condizione caratterizzata da gonfiore e dolore addominale, flatulenza e diarrea.

# AB 13C-LATTOSIO **BREATH TEST**

Test per il malassorbimento e l'intolleranza al lattosio

## Preparazione del Paziente

Per la massima attendibilità del test:

- **Il paziente deve essere a digiuno da almeno 3 ore**, può bere solo acqua non gassata.
- **Il paziente non deve fumare, né dormire, né fare esercizio fisico intenso per almeno mezz'ora prima e durante il test.**
- Il paziente deve **informare il medico se assume farmaci**, perché possono avere conseguenze sul risultato del test.
- **Il 13C-LATTOSIO breath test deve essere eseguito almeno una settimana dopo sospensione dell'uso di fermenti lattici.**

## Come si esegue il Breath Test

**Il test del respiro è sicuro e semplice da eseguire.**

Bastano 3 passaggi:




# BREATHQUALITY-UBT 13C-UREA **BREATH TEST**

Test per la diagnosi dell'infezione gastroduodenale da *Helicobacter Pylori*

## Preparazione del Paziente

Per la massima attendibilità del test:

- **Il paziente deve essere a digiuno da almeno 6 ore** e in condizioni di riposo. Può bere solo acqua non gassata.
- **Vanno esclusi dal test** i pazienti che sono stati sottoposti recentemente (meno di 4 settimane) a terapia con farmaci antibiotici, inibitori della secrezione acida, procinetici.